



BAĞ MİLDİYÖSÜ (*Plasmopara viticola*)

Etmeni fungus olup, her türlü yeşil aksamı hastalandırır. Sürgünler 25 cm iken hastalık görülür. Yaprakların üst yüzeyinde tipik yağ lekelere meydana gelir. Alt yüzlerinde beyaz bir misel örtüsü vardır. Bu kısımlar sarımtırak renklidir. Lekeler büyüdükçe ortaları kızarır ve dökülür.

Sürgünlerde eliptik lekeler meydana gelir. Hastalık şiddetli ise sürgün kurur. Çiçekler fungus ile örtülür ve kısa zamanda kururlar. Daneler küçük iken hastalığa daha çok yakalanır, çatlamaz buruşur ve meşinleşmiş bir hal alır.

Kışı yapraklarda geçirir. İlkbaharda sıcaklık 10C'yi aşınca çimlenir. Uygun şartlarda (22-25C) yapraklara ulaşır ve enfeksiyon yapar.

Enfeksiyon için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Enfeksiyonun büyük kısmı yaprağın alt yüzeyinden olur. Yaz boyunca enfeksiyonlar devam eder. Sıcaklık 30C'yi aştığı zaman önemini kaybeder.





Mücadelesi

Kültürel Önlemler: Budama ve koltuk alma işleri zamanında ve iyi bir şekilde yapılmalı, bağın altı temiz tutulmalı, yabancı otlar temizlenmeli, lüzumundan fazla sulanmamalı, yere düşen yapraklar temizlenmelidir.

Kimyasal Mücadele: Tahmin uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde mücadeleye hastalık görülmeden önce başlanmalıdır. Birinci ilaçlama, sürgünlerin 25-30 cm boyuna ulaştığı, günlük ortalama sıcaklığın 18C'yi bulduğu nispi neminde % 70-80'e ulaştığı günlerde yapılmalıdır.

İkinci ve daha sonraki ilaçlamaların yapılmasında ilacın etki süresi dikkate alınmalı ve hava koşulları kontrol edilmelidir.

BAĞ MİLDİYÖSÜ



Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürlüğü

No: B/6
2018



SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

<http://samsun.tarimorman.gov.tr>

E-Posta : samsun@tarimorman.gov.tr

Kılıçdede Mah. Abdülhakhamit Cad. No:5 55060 İlkadım/SAMSUN

Telefon : 0362 2313700 (3 Hat) Faks : 0362 2332163



SAMSUN
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ